



Cómo comenzar con
DAYBUE® (trofinetida)

Iluminemos el mundo con su brillo

DAYBUE es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para el síndrome de Rett

*Kate, de 9 años, que tiene el **síndrome de Rett**, con sus padres*

Indicación

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en personas menores de 2 años.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 18-19. Lea la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.



Cómo comenzar con DAYBUE

Ahora que su médico le ha recetado DAYBUE, usted y su ser querido están listos para explorar su nuevo camino. Al igual que con cualquier medicamento nuevo, puede que tenga preguntas al comenzar el tratamiento; tendrá apoyo disponible a través de Acadia Connect® para ayudarle en el camino.

Esta guía contiene información sobre los siguientes temas:

	Sobre DAYBUE.....	4-5
	Entrega y almacenamiento.....	6-7
	Cómo administrar DAYBUE.....	8-11
	Posibles efectos secundarios.....	12-15
	Seguimiento de cambios con DAYBUE.....	16-17
	Información importante de seguridad.....	18-19
	Apoyo para el tratamiento	20-22



Clare, de 8 años, que tiene el **síndrome de Rett**, toma DAYBUE desde 2021



¿Qué es DAYBUE?

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más.

Más de 1700 personas con síndrome de Rett, incluidos adultos, niñas y niños con diferentes síntomas, han comenzado a tomar DAYBUE.

Kate, de 9 años de edad, tiene el síndrome de Rett



Sobre DAYBUE

DAYBUE es un medicamento oral que:



Se toma dos veces al día, por la mañana y por la noche



Se puede tomar con o sin alimentos



Sabor a fresa

Consulte la página 8 para obtener más información sobre cómo administrar DAYBUE.

La cantidad de DAYBUE que se administra dependerá del peso de su ser querido. **El médico de su ser querido decidirá la dosis correcta según sus antecedentes médicos y cómo responda a DAYBUE.**

DAYBUE no cura el síndrome de Rett y los resultados pueden ser diferentes para cada persona.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Vómitos:** Los vómitos son un efecto secundario frecuente de DAYBUE. A veces, los vómitos pueden llegar a los pulmones (aspiración), lo que podría causar una infección (neumonía por aspiración). Informe a su proveedor de atención médica si tiene vómitos intensos o si estos se producen con frecuencia.
- **Pérdida de peso:** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE fueron diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 18-19. Lea la **Información de prescripción completa**, incluida la **Información para el paciente**.



¿Cómo se entregará DAYBUE?

Solo una farmacia especializada puede surtir su receta de DAYBUE.

Colaboramos con AnovoRx, nuestra exclusiva farmacia especializada, para procesar y llenar las recetas. Cuando AnovoRx termine con la receta médica de su ser querido, programarán la entrega en el lugar que más le convenga a usted. Acadia Connect también lo contactará regularmente para coordinar el envío de resurtidos.

¿Qué es una farmacia especializada?

Una farmacia especializada es diferente de una farmacia común. Se enfoca en medicamentos que necesitan un cuidado especial para manejarlos, guardarlos y entregarlos, como DAYBUE.

Cada mes recibirá un envío en una caja refrigerada con:



Seis u ocho frascos de DAYBUE dependiendo de la dosis basada en el peso de su ser querido



Dos jeringas orales y dos adaptadores de frascos a presión (Press-In Bottle Adapters, PIBA)

¿Tiene preguntas sobre su entrega?

Llame a Acadia Connect para obtener ayuda al 1-844-737-2223, de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del este.

¿Cómo debo almacenar DAYBUE?

Cuando reciba su envío:



Conserve DAYBUE en un refrigerador a una temperatura entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C)



Deseche todo el DAYBUE que no se haya utilizado después de 14 días de abrir el frasco



Guarde siempre DAYBUE en posición vertical



Mantenga bien cerrada la tapa a prueba de niños



No lo congele



Mantenga DAYBUE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños

Consejo útil



Asegúrese de anotar la fecha en la que abra el frasco en la etiqueta lateral de su medicamento o en otro lugar conveniente. Use DAYBUE dentro de 14 días después de abrirlo.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DAYBUE?

Antes de tomar DAYBUE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planifica quedarse embarazada. Se desconoce si DAYBUE dañará al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si DAYBUE pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas [18-19](#).





¿Cómo debo darle DAYBUE a mi ser querido?

Estas son algunas cosas útiles que debe saber sobre cómo administrar DAYBUE:

- ✓ DAYBUE se puede tomar por la boca o por una sonda de gastrostomía (G). Si su ser querido tiene una sonda gastroeyunal (GY), DAYBUE debe administrarse por el puerto G
- ✓ Administre DAYBUE exactamente como el médico le indique
- ✓ Use el medidor que la farmacia le dio para medir cada dosis. No use un vaso de medir hogareño
- ✓ Si su ser querido olvida una dosis de DAYBUE, sáltela y administre la siguiente dosis a la hora normal. No dé 2 dosis para compensar la que olvidó
- ✓ Si su ser querido vomita después de tomar DAYBUE, no administre otra dosis para compensarla. Espere hasta la siguiente dosis programada. Llame a su médico si los vómitos no se detienen
- ✓ DAYBUE se puede tomar con o sin comida

Información importante de seguridad (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar DAYBUE con ciertos medicamentos puede afectar cómo actúan los otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 18-19.



*Maddy, de 21 años, que tiene el **síndrome de Rett**, junto a su mamá*



Consejos útiles para administrar DAYBUE

Estos consejos pueden ayudarle a administrar DAYBUE por boca:



Use algo frío, como un helado, un cubito de hielo o agua fría, para adormecer la lengua antes de administrar DAYBUE



Sumerja la jeringa de medicamento en jarabe dulce* y vierta DAYBUE suavemente por el lado de la mejilla de su ser querido. No vierta en la parte posterior de la garganta, ya que esto podría hacer que se ahogue



Use el juego para que su ser querido participe más en tomar DAYBUE, como fingir que le da la medicina a su juguete favorito



Dele una comida o bebida de sabor fuerte para ayudar a eliminar el sabor



Cuando termine, piense en darle una recompensa a su ser querido, como jugar su juego favorito

Kate, de 9 años de edad, tiene el síndrome de Rett

*DAYBUE no debe mezclarse directamente con ningún endulzante.

 **Daybue**
(trofinetide)



Henry, de 4 años de edad, tiene el síndrome de Rett



Consejo útil

Prepárese con tiempo. Tenga cosas como toallitas, portatubos, pañales extras, y una bolsa con un cambio de ropa para cuando salga de casa.

Entender los posibles efectos secundarios de DAYBUE

Como con cualquier medicamento, es importante hablar con el médico de su ser querido sobre los posibles efectos secundarios de DAYBUE. No todas las personas tendrán los mismos efectos secundarios, y para algunas, ciertos efectos como diarrea y vómitos pueden ser más graves que otros.

Los efectos secundarios pueden incluir:



Diarrea

La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que su ser querido pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su médico si su ser querido tiene diarrea mientras está tomando DAYBUE. Su médico puede pedirle que aumente la cantidad de líquido que su ser querido bebe o que tome medicamentos antidiarreicos si fuera necesario.



Vómitos

Los vómitos son un efecto secundario frecuente de DAYBUE. A veces, los vómitos pueden llegar a los pulmones de su ser querido (aspiración), lo que podría causar una infección (neumonía por aspiración). Informe a su médico si su ser querido tiene vómitos intensos o si estos se producen con frecuencia.



Pérdida de peso

DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su médico si nota que su ser querido está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.

Los efectos secundarios más frecuentes incluyen:

- Diarrea
- Vómitos

Otros posibles efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Usted y el médico de su ser querido deben controlar los efectos secundarios y trabajar juntos para ayudar a controlarlos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas [18-19](#).





Consejos útiles para manejar los efectos secundarios gastrointestinales

Muchas personas con síndrome de Rett tienen problemas gastrointestinales (GI), como estreñimiento o reflujo. Si su ser querido tiene problemas gastrointestinales, hable con su médico sobre un plan para comenzar con DAYBUE.

Aquí hay algunos consejos antes de que su ser querido empiece a tomar DAYBUE:

- ✓ Piense en llevar un registro para anotar cómo y cuándo su ser querido va al baño durante una semana antes de empezar el tratamiento
- ✓ Dígale al médico si le está dando a su ser querido algo para ablandar las heces u otros medicamentos o suplementos para el estreñimiento
- ✓ Deje de usar laxantes
- ✓ Hable con su médico sobre cambios en la dieta, como usar fibra extra

Si le preocupa la diarrea al empezar DAYBUE:

- Según el criterio clínico y su experiencia, el médico puede decidir comenzar con una dosis más baja y aumentar a la dosis recomendada por la FDA según el peso a lo largo del tiempo
- Es posible que no se produzcan mejoras hasta que su ser querido alcance la dosis recomendada y siga con el tratamiento
- Los efectos de este enfoque en la diarrea no se estudiaron en el ensayo LAVENDER™. La respuesta individual del paciente puede variar

Los hallazgos del ensayo LAVENDER se basaron en pacientes que empezaron a tomar la dosis de DAYBUE recomendada por la FDA según el peso y continuaron el tratamiento durante 12 semanas.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas [18-19](#).



Si se produce diarrea:

- ✓ Informe a su médico si su ser querido tiene diarrea
- ✓ Cuide que su ser querido tome suficiente agua y esté atento a los signos de deshidratación; dé más agua si es necesario. Su médico también puede sugerirle un suplemento de fibra, si corresponde
- ✓ Se recomienda que tenga medicamentos antidiarreicos como loperamida (IMODIUM®) en el hogar para que pueda tratar la diarrea según sea necesario
- ✓ Su médico puede reducir la dosis de DAYBUE o puede pedirle que deje de administrarle DAYBUE a su ser querido hasta que mejore la diarrea. No deje de administrar DAYBUE antes de hablar con su médico



Consejos generales para manejar los vómitos:

- ✓ Informe a su médico si su ser querido tiene vómitos. Su médico puede sugerirle que tome medicamentos para ayudar a tratar los vómitos
- ✓ Coma en algún lugar tranquilo. El estómago de su ser querido puede ser sensible al estrés. Encontrar un lugar relajado para comer puede reducir la probabilidad de vómitos
- ✓ No coma antes de dormir o de la siesta
- ✓ Lleve un diario de las comidas. Esto puede ayudar a ver si hay una relación entre ciertos alimentos y los vómitos. Al quitar alimentos uno por uno, puede descubrir si un alimento en particular causa los vómitos
- ✓ Hable con su médico si los vómitos no se detienen

Esta no es una lista completa de cómo tratar los vómitos. Hable con su médico para hacer un plan que se adapte a las necesidades de su ser querido.

¿Qué tan pronto se ven las mejoras con DAYBUE?

En el ensayo LAVENDER, los cuidadores y los médicos observaron mejoras en los signos y síntomas del síndrome de Rett apenas 12 semanas después de empezar a tomar DAYBUE, en comparación con el placebo. No todas las pacientes del estudio respondieron al tratamiento con DAYBUE. Los resultados individuales pueden variar.



Consejos para llevar un registro de los signos y síntomas del síndrome de Rett:

- ✓ Anote los signos y los síntomas antes de empezar a tomar DAYBUE
- ✓ Pida a todos los integrantes del equipo de cuidado médico de su ser querido que observen e informen cualquier cambio
- ✓ Anote los movimientos de las manos, la mirada y los comportamientos nocturnos: cualquier cosa en la vida de su ser querido que afecte el síndrome de Rett
- ✓ Fíjese en cómo afectan incluso los pequeños cambios

El tiempo para ver resultados del tratamiento puede ser diferente para cada persona. Puede tomar tiempo ver mejoras en los síntomas. Trabaje con su médico para entender los síntomas de su ser querido y cómo seguirlos con el tiempo.



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas [18-19](#).



Maddy, de 21 años, que tiene el **síndrome de Rett**, (a la derecha), junto a su mamá

Seguimos usando DAYBUE porque seguimos viendo mejoras.

– Amy, mamá de Maddy

Amy es consultora remunerada de Acadia Pharmaceuticals Inc.



Indicación e información importante de seguridad

¿Qué es DAYBUE?

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en personas menores de 2 años.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Vómitos:** Los vómitos son un efecto secundario frecuente de DAYBUE. A veces, los vómitos pueden llegar a los pulmones (aspiración), lo que podría causar una infección (neumonía por aspiración). Informe a su proveedor de atención médica si tiene vómitos intensos o si estos se producen con frecuencia.
- **Pérdida de peso:** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE fueron diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DAYBUE?

Antes de tomar DAYBUE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planifica quedarse embarazada. Se desconoce si DAYBUE dañará al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si DAYBUE pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar DAYBUE con ciertos medicamentos puede afectar cómo actúan los otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Se recomienda que notifique los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede llamar a Acadia Pharmaceuticals Inc. al 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).

DAYBUE está disponible en forma de solución oral (200 mg/ml).

La información sobre riesgos que se proporciona aquí no es completa. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica y lea la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente, también disponible en DAYBUE.com/es.



Apoyo a su lado

Los miembros del equipo de Acadia Connect están listos para ayudar

Acadia Connect es un programa de apoyo al paciente y la familia que los conecta a usted y a su familia con recursos y apoyo educativo antes y después de que se le recete DAYBUE. El equipo le ayudará a:

- Entender el síndrome de Rett
- Proporcionar información sobre DAYBUE
- Responder preguntas sobre la cobertura del seguro
- Información sobre posibles opciones de asistencia financiera
- Apoyo y educación durante la experiencia del tratamiento con DAYBUE



Educador de apoyo familiar

Su educador de apoyo familiar se dedica a proporcionar apoyo continuo y a educar sobre los productos para el tratamiento con DAYBUE.

- Le ayuda a obtener más información sobre el síndrome de Rett y el posible tratamiento con DAYBUE
- Proporciona educación individual o virtual en persona
- Responde preguntas sobre la cobertura del seguro
- Le ayuda a prepararse para el tratamiento con DAYBUE, incluida educación sobre los efectos secundarios
- Lo mantiene informado sobre nuevos recursos de aprendizaje, eventos y mucho más
- Lo conecta con otros cuidadores de la comunidad



Coordinador de atención de enfermería

El coordinador de atención de enfermería está dedicado a ayudar a su ser querido a recibir su tratamiento DAYBUE y a proporcionar apoyo siempre que lo necesite.

- Verifica sus beneficios de seguro
- Proporciona información sobre posibles opciones de asistencia financiera
- Coordina con usted y con la farmacia especializada AnovoRx para la entrega oportuna de DAYBUE



Gerente de acceso de pacientes

El gerente de acceso de pacientes se dedica a ayudar a su médico con el proceso de receta y seguro de DAYBUE, para que su ser querido pueda comenzar con el tratamiento.

- Le proporciona a su médico información sobre cómo lograr que DAYBUE esté cubierto para su ser querido
- Continúa brindando apoyo de seguro a su médico para ayudar a reducir las brechas en el proceso de tratamiento de su ser querido con DAYBUE



acadia
connect®

Acadia Connect se asocia con la farmacia especializada AnovoRx

AnovoRx procesará y surtirá las recetas médicas de DAYBUE y cuenta con farmacéuticos clínicos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para:



Responder preguntas y ofrecer apoyo con el tratamiento para DAYBUE



Proporcionar información sobre posibles efectos secundarios



Ofrecer recomendaciones clínicas cuando corresponda

¿Preguntas?

Su equipo de Acadia Connect está aquí para apoyarle. Llame al 1-844-737-2223, de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del este.



Jill,
educadora de
apoyo familiar

Para sus pacientes mayores de 2 años con síndrome de Rett

Aproveche al máximo su experiencia con DAYBUE

Conclusiones clave para ayudarlos a usted y a su ser querido a prepararse para el tratamiento:



Haga un seguimiento de los síntomas del síndrome de Rett

Trabaje con su equipo de cuidado médico para anotar los síntomas que presenta su ser querido antes de comenzar el tratamiento y hacer un seguimiento de los cambios con el tiempo



Prepárese con un plan de control de los efectos secundarios

Antes de comenzar el tratamiento, trabaje con el médico de su ser querido para elaborar un plan que permita controlar los posibles efectos secundarios. Informe siempre al médico de inmediato si se produce un efecto secundario y es molesto o si no desaparece



Siga las instrucciones para administrar DAYBUE

Siga siempre las instrucciones del médico de su ser querido para administrar DAYBUE



Busque apoyo para el tratamiento

Acadia Connect está aquí para proporcionarle apoyo y recursos educativos a lo largo de su experiencia con el tratamiento



Visite DAYBUE.com/es para escuchar a un cuidador que comparte su experiencia con DAYBUE

Maddy, de 21 años, que tiene el síndrome de Rett, junto a su mamá, Amy

Indicación

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en personas menores de 2 años.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 18-19. Lea la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente, también disponible en DAYBUE.com/es.



ACADIA

©2025 Acadia Pharmaceuticals Inc. Acadia, Acadia Connect y DAYBUE son marcas comerciales registradas de Acadia Pharmaceuticals Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. DAY-0238-v6 06/25



Daybue[®]
(trofinetide)

INFORMACIÓN DEL PACIENTE DAYBUE™ (trofinetida) en solución oral

¿Qué es DAYBUE?

- DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más.
- No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en personas menores de 2 años.

Antes de tomar DAYBUE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planea quedarse embarazada. Se desconoce si el DAYBUE causará daño al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si DAYBUE pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Tomar DAYBUE con ciertos medicamentos puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos para mostrárselo a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

¿Cómo debo tomar DAYBUE?

- Tome DAYBUE exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Si toma laxantes, deje de tomarlos antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE.
- Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis o interrumpir el tratamiento con DAYBUE si es necesario.
- Su farmacéutico debe proporcionarle una jeringa para uso oral o un vaso dosificador necesario para medir la dosis prescrita. **No** utilice un vaso de medición doméstico.
- DAYBUE puede tomarse por vía oral o administrarse a través de una sonda de gastrostomía (G). Si se administra DAYBUE a través de una sonda gastroyeyunal (GJ), debe utilizarse el puerto G.
- DAYBUE se puede tomar con o sin alimentos.
- Deseche todo el DAYBUE que no se haya utilizado después de 14 días de abrir el frasco por primera vez.
- Si vomita después de tomar una dosis de DAYBUE, **no** tome otra dosis para compensar esa dosis. Espere y tome la siguiente dosis a su hora habitual. Llame a su proveedor de atención médica si los vómitos no se detienen.
- Si omite una dosis de DAYBUE, sátese esa dosis y tome la siguiente a la hora habitual. **No** tome 2 dosis para compensar la dosis omitida.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

DAYBUE puede causar efectos secundarios, incluidos:

- **Diarrea.** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Pérdida de peso.** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Vómitos.** Los vómitos son un efecto secundario frecuente de DAYBUE. A veces, los vómitos pueden llegar a los pulmones (aspiración), lo que podría causar una infección (neumonía por aspiración). Informe a su proveedor de atención médica si tiene vómitos intensos o si estos se producen con frecuencia.

Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE incluyen diarrea y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo conservar DAYBUE?

- Conservar en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C). **No** congelar.
- Mantener DAYBUE en posición vertical.
- Mantener bien cerrada la tapa a prueba de niños.

Mantener DAYBUE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de DAYBUE.

En ocasiones, los medicamentos se prescriben para fines distintos de los que se enumeran en la hoja de información del paciente. No use DAYBUE para una afección para la que no se haya prescrito. No administre DAYBUE a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede causarles daños. Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre el DAYBUE escrita para profesionales sanitarios.

¿Cuáles son los ingredientes en DAYBUE?

Principio activo: trofinetida

Ingredientes inactivos: FD&C Rojo N.º 40, maltitol, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, agua purificada, saborizante de fresa y sucralosa.

Comercializado por Acadia Pharmaceuticals Inc., San Diego, CA 92130 EE. UU.
DAYBUE es una marca comercial registrada de Acadia Pharmaceuticals Inc.

©2024 Acadia Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, visite www.daybue.com o llame al 1-844-422-2342.

Esta es una traducción certificada de la información para el paciente aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

Aprobado 9/2024

DAY-0213-v2